



U slučaju da korisnik već primenjuje neku terapiju, pije lekove ili koristi insulin, zadržava svoju postojeću terapiju i na nju dodaje novu, *CuraLin*. Vema je važno da svoju postojeću terapiju koriguje po potrebi u momentu kad *CuraLin* počne da očekivano deluje, da ne bi došlo do prekomernog pada glukoze (šećera) u krvi, a time i hipoglikemije (opasno stanje prouzrokovano niskim vrednostima glukoze (šećera)). Kada korisnik zabeleži padove glukoze (šećera) u vrednostima između 5 mmol/l - 6 mmol/l, tada treba postepeno i polako da koriguje svoju hemijsku terapiju za šećer, u konsultaciji sa svojim lekarom. Upozoravamo, da korišćenje preparata *CuraLin* mora biti pod strogom kontrolom korisnika i po mogućnosti praćeno lekarskim nadzorom, naročito u prvih nedelju dana. Razlog je klinički dokazana, uočljiva i brza efikasnost *CuraLin*-a!

Treba očekivati brza i uočljiva poboljšanja, koja se ogledaju u padu povišenih nivoa glukoze (šećera) u krvi, kao reakcija na biljnu terapiju *CuraLin*-om. Iskustva u svetu govore da su u preko 70% slučajeva ti rezultati vidljivi već u prva 72 sata primene *CuraLin*-a. Zato korisnik mora biti spreman, da u konsultaciji sa svojim lekarom reaguje i po potrebi odmah koriguje prethodnu postojeću hemijsku terapiju (SGLT2 inhibitori, metformin, sulfonamidi, insulin...). Terapija se mora korigovati postepeno i polako, nikako odjednom!

U slučaju da koristite TEST pakovanje za 7 dana ili ste iz nekog razloga ostali bez *CuraLin*-a, nije nikakav problem da se terapija nastavi i primenjuje na isti gore navedeni način. Prateći savete stručnjaka, koristeći lekove i *CuraLin*, uz nezamenljivu pravilnu ishranu i uravnoteženu fizičku aktivnost, možete voditi kvalitetniji i bolji život s dijabetesom.

## Pravilno doziranje

U odnosu na tromesečni (HbA1c) nivo glukoze (šećera) u krvi, pije se sledeći broj kapsula dnevno:

6,1 - 6,7 mmol/l	2 kapsule	jedna posle doručka i jedna posle večere*
6,7 - 7,8 mmol/l	4 kapsule	jedna posle doručka, jedna posle ručka i dve posle večere*
>7,8 mmol/l	6 kapsula	dve posle doručka, dve posle ručka, dve posle večere*
*U slučaju da je veliki vremenski razmak između večere i doručka (više od 10-12 h, preporučuje se da se večernja terapija popije pre spavanja).		