

U slučaju da korisnik već primenjuje terapiju propisanu od strane lekara, pije lekove ili koristi insulin, zadržava svoju postojeću terapiju i na nju dodaje novu, *CuraLin*. Vema je važno da svoju postojeću terapiju koriguje po potrebi u momentu kad *CuraLin* počne da očekivano deluje, da ne bi došlo do prekomernog pada glukoze (šećera) u krvi, a time i hipoglikemije (opasno stanje prouzrokovano niskim vrednostima glukoze (šećera)). Kada korisnik zabeleži normalizaciju nivoa glukoze (šećera) u vrednostima između 5 mmol/l - 6 mmol/l, tada treba postepeno i polako da koriguje svoju hemijsku terapiju za šećer, u konsultaciji sa svojim lekarom. Napominjemo da korišćenje preparata *CuraLin* treba biti, po mogućnosti, u početku - prvih nedelju dana, praćeno lekarskim nadzorom, odnosno lekar treba biti upoznat ukoliko dođe do suviše brzog smanjenja vrednosti šećera u dnevnim merenjima. Razlog je klinički dokazana, uočljiva i brza efikasnost *CuraLin*-a, kao reakcija na biljnu terapiju *CuraLin*-om.

Iskustva u svetu govore da su u preko 70% slučajeva ti rezultati vidljivi već u prva 72 sata primene *CuraLin*-a. Zato korisnik mora biti spreman, da u konsultaciji sa svojim lekarom reaguje i po potrebi odmah koriguje prethodnu postojeću hemijsku terapiju (SGLT2 inhibitori, metformin, sulfonilurea, insulin...). Hemijska terapija se mora korigovati postepeno i polako, nikako naglo ni odjednom!

Klinički ispitani sastojci koji čine originalni i jedinstven sastav *CuraLin*-a dokazano deluju na ćelijskom nivou na tri osnovna načina: povećavaju osetljivost na insulin u mišićnim i masnim ćelijama, dovode do obnavljanja lučenja insulina u ćelijama pankreasa i pomažu smanjenju preuzimanja šećera i razlaganje šećera u crevima.

Kao glavni ishod ovakvog dejstva *CuraLin*-a, Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) je potvrdila da sastojci *CuraLin*-a pomažu održavanju normalnog nivoa šećera u krvi i organizmu (ident. broj tvrdnji: 2642 i 2091).

Pravilno doziranje

U odnosu na tromesečni (HbA1c) nivo glukoze (šećera) u krvi, pije se sledeći broj kapsula dnevno:

6,1 - 6,7 %	2 kapsule	jedna 30 minuta posle doručka i jedna pred spavanje
6,7 - 7,8 %	4 kapsule	jedna 30 minuta posle doručka, jedna 30 minuta posle ručka i dve pred spavanje
>7,8 %	6 kapsula	dve 30 minuta posle doručka, dve 30 minuta posle ručka, dve pred spavanje

Kliničkom studijom je dokazano da nema kontraindikacija ni neželjenih efekata.